

MESURES BARRIERES

CONSULTATION DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE POUR PATIENT NON SUSPECT COVID



CNP

PATIENTS



- 1 masque chirurgical ou artisanal
- Son stylo
- Sa carte bancaire (préférée)
- Reporter le Rendez-vous si : toux, fièvre, courbatures, diarrhées, perte odorat/goût
⇒ Appel Med traitant ou 15
- L'accompagnant reste dehors
- SHA ou lavage des mains à l'entrée

SECRETARIAT



CONSIGNES D'ACCUEIL

- 1 mètre minimum
- SHA entre chaque patient
- Marquage au sol + cloison vitrée ou plexiglass
- Masque ou visière
- Pas de prêt de stylo

CONSIGNES REGLEMENT

- Gants jetables si espèce + film plastique sur boîtier CB et Vitale ou Sans contact
- Nettoyage banque d'accueil entre chaque patient

VOTRE CHIRURGIEN



- Masque chirurgical
- +/- lunettes de protection
- Tenue dédiée à la consultation (éviter les tenues civiles)
- SHA ou lavage des mains entre chaque patient (essuie-mains jetables)

SALLE D'ATTENTE



- Limiter le nombre de patients
- Suppression journaux & jouets
- Espacer les sièges d'1 mètre (condamner des sièges / marquage au sol)
- Désinfection régulière sièges, poignées et rampes
- Limiter la climatisation + aérer les pièces
- Eviter le face à face patient ou cloison vitrée ou plexiglass

SALLE DE CONSULTATION



- Désinfection
 - Entre chaque passage :
 - Sièges et accoudoirs
 - Surface clavier et souris
 - Matériels divers
- Limiter la climatisation + aérer la pièce
- Poubelle refermable avec sac plastique

MASQUES



- En appui sur la racine du nez
- Couvre le visage et la bouche
- Ne pas se toucher le visage
- L'enlever par les élastiques
- A jeter : si humide ou 4h si masque chirurgical ou 8h si FFP2
- Si Lavable : 30° à 60°C + sèche linge
- Avant et après masque : SHA

LA REPRISE D'ACTIVITE DE CONSULTATION EST POSSIBLE SI

- Privilégier la téléconsultation
- Respect des conditions d'hygiène et de protection
- Espacement des consultations
- Sélection des patients : urgences ou pathologies exposant les patients à une perte de chance

FACTEURS DE RISQUE (FdR)

- Age > 70 ans
- Malades CV ou respiratoires
- Immunodéprimés
- Cancer, hémophilie, cirrhose
- Grossesse
- Obésité, diabète
- Insuffisance rénale
- Prise d'anti-inflammatoires



MESURES BARRIERES

CONSULTATION

DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

POUR PATIENT NON SUSPECT COVID



PATIENTS



- 1 masque chirurgical ou artisanal
- Son stylo
- Sa carte bancaire (préférée)
- Reporter le Rendez-vous si : toux, fièvre, courbatures, diarrhées, perte odorat/goût
⇒ Appel Med traitant ou 15
- L'accompagnant reste dehors
- SHA ou lavage des mains à l'entrée

SECRETARIAT



CONSIGNES D'ACCUEIL

- 1 mètre minimum
- SHA entre chaque patient
- Marquage au sol + cloison vitrée ou plexiglass
- Masque ou visière
- Pas de prêt de stylo

CONSIGNES REGLEMENT

- Gants jetables si espèce + film plastique sur boîtier CB et Vitale ou Sans contact
- Nettoyage banque d'accueil entre chaque patient

VOTRE CHIRURGIEN



- Masque chirurgical
- +/- lunettes de protection
- Tenue dédiée à la consultation (éviter les tenues civiles)
- SHA ou lavage des mains entre chaque patient (essuie-mains jetables)

SALLE D'ATTENTE



- Limiter le nombre de patients
- Suppression journaux & jouets
- Espacer les sièges d'1 mètre (condamner des sièges / marquage au sol)
- Désinfection régulière sièges, poignées et rampes
- Limiter la climatisation + aérer les pièces
- Eviter le face à face patient ou cloison vitrée ou plexiglass

SALLE DE CONSULTATION



- Désinfection
 - Entre chaque passage :
 - Sièges et accoudoirs
 - Surface clavier et souris
 - Matériels divers
- Limiter la climatisation + aérer la pièce
- Poubelle refermable avec sac plastique

MASQUES



- En appui sur la racine du nez
- Couvre le visage et la bouche
- Ne pas se toucher le visage
- L'enlever par les élastiques
- A jeter : si humide ou 4h si masque chirurgical ou 8h si FFP2
- Si Lavable : 30° à 60°C + sèche linge
- Avant et après masque : SHA

LA REPRISE D'ACTIVITE DE CONSULTATION EST POSSIBLE SI

- Privilégier la téléconsultation
- Respect des conditions d'hygiène et de protection
- Espacement des consultations
- Sélection des patients : urgences ou pathologies exposant les patients à une perte de chance

FACTEURS DE RISQUE (FdR)

- Age > 70 ans
- Malades CV ou respiratoires
- Immunodéprimés
- Cancer, hémophilie, cirrhose
- Grossesse
- Obésité, diabète
- Insuffisance rénale
- Prise d'anti-inflammatoires

